

GUIDE D'INFORMATION

Avortement par médicaments

Pour nous joindre : 819 378-6130

Lundi au vendredi : 9h30 à 16h30

Info Santé : 811 (24 h/7 j)

Le Centre de santé des femmes est un organisme communautaire ayant une approche féministe. L'accès à l'avortement est au cœur de la mission première du Centre. Il répond, depuis 1981, aux besoins des femmes d'avoir recours à ce service en dehors du milieu hospitalier et offre la possibilité d'avoir toute l'information et le soutien nécessaire à travers tout le processus d'interruption de grossesse. Notre rôle est de vous offrir le service d'avortement dans les meilleures conditions, tant sur le plan médical que sur le plan humain. Votre bien-être est au cœur de nos préoccupations.

Pour certaines femmes, la décision d'interrompre la grossesse a été relativement facile à prendre; pour d'autres, elle s'est avérée plus difficile. Chaque femme vit son processus d'avortement de façon différente.

On vous a remis cette brochure à la suite de votre choix d'avoir un avortement par médicament (Mifegymiso). Si vous vous questionnez tout de même sur votre décision d'interrompre cette grossesse ou vous ressentez le besoin de parler de votre décision à quelqu'un de neutre, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. Nous vous accompagnerons dans le processus de réflexion tout en respectant votre choix, quel qu'il soit.

Les frais de l'avortement sont couverts par la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), vous devez donc avoir en main votre carte RAMQ à tous vos rendez-vous. Si vous n'avez pas de carte RAMQ valide, on vous renseignera sur les frais à déboursier (payables en argent comptant ou par virement bancaire).

Cette brochure contient les informations relatives aux prochains rendez-vous pour l'avortement, la procédure, les risques et complications ainsi que les recommandations après l'avortement.

Consignes avant le rendez-vous préparatoire à l'avortement

- Téléphonnez-nous dès que possible si vous **décidez d'annuler votre rendez-vous**. Si la ligne est occupée ou que le Centre est fermé, **laissez un message** sur la boîte vocale au 819 378-1661.
- **Consultez à l'urgence** si vous avez des saignements abondants, de gros caillots ou de fortes douleurs au ventre d'ici votre rendez-vous;
- Il est **recommandé de prendre congé** (travail/école) le jour de la prise du misoprostol à domicile et la journée suivante. Au besoin, on vous remettra un billet médical justifiant vos absences.

Rendez-vous préparatoire à l'avortement

Prévoyez une **rencontre d'environ 1h30**.

Ayez en main votre carte d'assurance maladie du Québec (RAMQ) valide, votre autorisation temporaire de la RAMQ ou votre formulaire d'assurance privée (avec argent comptant ou informations pour faire un virement bancaire);

À votre arrivée au Centre, vous serez accueillie par une intervenante qui vous donnera les explications générales concernant les méthodes d'avortement possibles. Si vous le voulez, la personne qui vous accompagne pourra être avec vous.

Par la suite, vous rencontrerez seule une infirmière qui évaluera votre état de santé actuel ainsi que vos antécédents de santé. Elle procédera également à une échographie intravaginale ou abdominale pour ainsi établir votre éligibilité pour l'avortement par

médicaments. Elle effectuera le dépistage de certaines infections transmises sexuellement. Enfin, vous pourrez discuter de vos besoins en lien avec la contraception.

Dans certains cas, une prise de sang sera nécessaire (détection du groupe sanguin, dosage du taux d'hormones de grossesse, formule sanguine, etc.). Si des actions sont nécessaires à la suite de cette prise de sang, vous en serez avisée.

Un rendez-vous avec le médecin (téléphonique ou en personne selon la situation) vous sera donné dans les 48 heures suivantes pour la prescription du Mifégymiso.

Rendez-vous de prescription du Mifégymiso^{MD}

Lors de ce rendez-vous le médecin :

- Validera votre consentement pour l'avortement ;
- Prescrit à votre pharmacie :
 - le Mifegymiso (gratuit avec présentation d'une carte RAMQ valide);
 - les médicaments contre la douleur et contre les nausées/vomissements (le Gravol^{MD} est gratuit avec une carte RAMQ valide, il y a des frais d'environ 15 \$ pour les médicaments contre la douleur);
 - la contraception, tel que discuté avec l'infirmière;
- Donnera les conseils d'usage pour la prise des médicaments;
- Répondra à toutes autres questions.

2 semaines après la prise du Mifégymiso^{MD}

Vous aurez une **rencontre téléphonique avec l'infirmière** d'environ **20 minutes**.

L'infirmière complètera avec vous un questionnaire médical. Ce rendez-vous permettra d'évaluer si le déroulement de votre avortement ou votre état de santé actuelle requiert un suivi en personne. Si tel est le cas, un rendez-vous avec le médecin vous sera donné pour effectuer un examen physique afin d'évaluer la présence de complications (infection, avortement incomplet, etc.). Un rendez-vous est aussi possible pour faire l'installation d'un stérilet, de l'implant contraceptif ou effectuer une cytologie

5 semaines après la prise du Mifégymiso^{MD}

Vous aurez une rencontre d'environ 10 minutes avec l'infirmière par téléphone. Vous devez avoir fait le test de grossesse urinaire le jour avant le rendez-vous. Le test permettra de confirmer que l'avortement est complet. (Veuillez noter qu'un test de grossesse peut être positif jusqu'à quatre semaines après un avortement, il est donc important de le faire au moment indiqué par l'infirmière.) Si votre état de santé le requiert, l'infirmière pourra prévoir un suivi médical en personne avec le médecin afin de s'assurer que vous ne souffrez pas de complications. Il est fortement déconseillé de voyager à l'extérieur du pays avant d'avoir la confirmation que l'avortement est complet. Il est important d'aviser l'équipe si vous avez l'intention de voyager pendant cette période.

Étapes de l'avortement par médicaments et effets secondaires

L'avortement se fait en **deux étapes** avec deux types de médicaments, la mifépristone et le misoprostol connu sous le nom Mifegymiso. Il est primordial de respecter l'ordre des médicaments ainsi que le délai entre les deux médicaments pour en assurer leur efficacité.

1-PRISE DE LA MIFEPRISTONE

Le comprimé de mifépristone, pris par voie orale, bloque l'effet de la progestérone, ce qui arrête la grossesse. Le processus est irréversible à partir de ce moment.

Les effets secondaires de la mifépristone

Aucun effet secondaire dangereux n'a été rapporté. Des effets secondaires, légers et brefs, peuvent survenir : nausées, douleurs dans le bas-ventre, fatigue et frissons.

Certaines femmes peuvent avoir des saignements entre la première et deuxième étape du traitement. Il est même possible que la grossesse soit expulsée. Cependant, vous devez compléter le processus en prenant le misoprostol tel que convenu. Si vous vomissez le comprimé dans l'heure suivant la prise, veuillez nous appeler rapidement ou à votre pharmacie lorsque le Centre est fermé.

2-PRISE DU MISOPROSTOL

Les comprimés de misoprostol sont pris de 24 h à 48 h après la prise de la mifépristone.

Le misoprostol est une prostaglandine qui induit des contractions utérines, un ramollissement et une dilation du col de l'utérus afin d'aider à expulser le contenu intra-utérin.

Choisissez un moment favorable et un endroit confortable lors de la prise du misoprostol. La présence d'une personne de soutien est également souhaitable.

Mode d'emploi :

1h avant la prise du misoprostol

- Prendre le comprimé de Tylenol^{MD}, de Naproxen^{MD} et le Graval^{MD} tel que prescrit.

Prise du misoprostol

Il y a deux façons possibles de prendre le misoprostol.

- Placer deux comprimés de misoprostol dans chaque joue, entre la gencive inférieure et la joue (pour un total de quatre comprimés). Laisser fondre les comprimés 30 minutes. Ne pas manger ni boire d'eau pendant ce temps. Après cette période, vous devez avaler les morceaux restants avec un peu d'eau.

OU

- Mettre les comprimés dans votre vagin : insérer les 4 comprimés ensemble au fond du vagin. Par exemple, si vous êtes nauséuse malgré la prise du Graval^{MD}, cette option s'avère intéressante.

- Selon les indications médicales, prendre 4 autres comprimés de misoprostol, 4 heures plus tard, de la même façon.
- Prendre le Dilaudid^{MD}, tel que prescrit, si vous ressentez de la douleur non soulagée par les autres médicaments contre la douleur.

Sous l'effet du misoprostol, il y aura expulsion de la grossesse. Cela est semblable à une fausse-couche. Il faut s'attendre à des caillots, à des saignements plus abondants que les menstruations et à de fortes crampes qui provoquent des douleurs d'intensité variable, plus fortes que lors des menstruations. Ceci est normal, cela signifie que le processus est en cours. Les crampes et saignements d'intensité élevée ne devraient durer que quelques heures. Ils devraient ensuite diminuer en intensité. Dans 98% des cas, l'expulsion se produit dans les huit heures après la prise du misoprostol. Il peut y avoir des caillots, des tissus rosés ou blanchâtres, il est aussi possible que vous puissiez voir l'embryon parmi les saignements. Vous pouvez en disposer de la façon qui vous convient le mieux : toilette, poubelle, rite funéraire. Il n'est pas nécessaire d'apporter les tissus de grossesse expulsés au Centre au moment du rendez-vous de suivi.

Après l'expulsion de la grossesse, les saignements diminuent et durent en moyenne 14 jours. Il se peut que de légers saignements persistent jusqu'à 30 jours. Les menstruations reviennent habituellement quatre à six semaines après l'avortement.

Les effets secondaires du misoprostol

Les comprimés ont un effet sur le système digestif et peuvent causer :

- Diarrhée (58%) ;
- Nausées (30%), vomissements (21%) ;
- Étourdissements (13%) ;
- Frissons (45%) (fréquent 30 à 60 minutes après la prise du misoprostol) ;
- Fièvre (45%) (dans les 24h après la prise du misoprostol et d'une durée de moins de six heures).

Autres effets secondaires possibles :

- Maux de tête (13) ;

Ces effets secondaires sont habituellement passagers et ne durent pas plus de 24h.

Il est possible que d'autres effets secondaires, encore inconnus et inhabituels, surviennent chez certaines femmes. Il est important de nous contacter ou appeler Info-Santé. Si vous avez un symptôme ou un effet secondaire inconfortable qui devient assez nuisible pour interférer avec vos activités quotidiennes, consulter à l'urgence.

Risques et complications possibles liés à l'avortement médical

Toute procédure médicale comporte des risques. L'avortement est très sécuritaire et **les complications sont rares**. Dans notre souci de vous offrir des informations justes et éclairées, il est important pour nous que vous soyez au courant des risques possibles.

- **Risque d'infection de l'utérus ou des trompes de Fallope** : Il arrive que des femmes développent spontanément une infection des organes internes (utérus, trompes). Une infection traitée par antibiotiques au tout début ne laisse habituellement aucune séquelle (<1%).
- **Risque d'hémorragie** : Les saignements peuvent être très abondants au point de nécessiter une intervention chirurgicale. Certaines femmes peuvent également avoir besoin d'une transfusion sanguine (<1%).
- **Allergie médicamenteuse** : Le risque de réactions allergiques au misoprostol et au mifépristone existe. Il se manifeste par une réaction au niveau de la peau (boutons, rougeurs, démangeaisons) ou dans les cas plus graves, au niveau respiratoire.
- **Rétention de produits de conception** : La grossesse peut être terminée sans que l'avortement soit complet (tissus placentaires ou membranes encore présents dans l'utérus). Il faut alors intervenir, soit par médicaments, par curetage ou par une aspiration (1-8%).

- **Poursuite de la grossesse et embryotoxicité** : Si la grossesse se poursuit à la suite de n'importe quelle phase du traitement (<1%), il y a un risque de malformations congénitales. Le Mifegymiso peut amener des anomalies fœtales (anomalies au niveau du cerveau, du crâne, des membres, syndrome de Moebius et des marqueurs de développement du fœtus). Si le Mifegymiso n'a pas fonctionné, vous devrez avoir recours à un avortement chirurgical.
- **Rupture d'une grossesse ectopique non détectée** : Même à la suite des meilleures pratiques exercées par le personnel médical, une grossesse ectopique pourrait passer inaperçue (<1%). La grossesse ectopique est une condition médicale qui requiert des soins urgents. Signes d'une grossesse ectopique : douleur soudaine dans le bas-ventre (souvent plus intense d'un côté), accentuation de la douleur/nausée, apparition soudaine d'une douleur à l'épaule, souffle court, étourdissement ou perte de conscience.
- **Syndrome du choc toxique** : Bien que rare, un choc toxique peut entraîner le décès (0,58/100 000). Il se traduit par une infection de l'utérus par certaines bactéries spécifiques. Il se manifeste par des symptômes pseudo-grippaux (douleurs musculaires, fatigue, maux de tête, toux sèche, malaise généralisé), une certaine douleur abdominale, faiblesse, baisse de la pression artérielle, pouls rapide, œdème, étourdissement, fièvre absente ou légère, nausées et vomissements. Les symptômes peuvent ressembler à ceux d'une grippe et peuvent débuter dans les jours suivant l'avortement.

- **Risque d'infertilité** : Une complication non traitée pourrait occasionner un problème de fertilité (c'était très fréquent quand l'avortement était clandestin), mais aujourd'hui le risque est quasi nul.
- **Décès** : Le risque de décès est quasiment nul et nous mettons tout en œuvre pour qu'un tel événement ne se produise pas. Les causes de décès peuvent être multiples telles que : rupture d'une grossesse ectopique non diagnostiquée, trouble grave de la coagulation non diagnostiqué, réactions allergiques graves, choc toxique ou autre problème de santé non déclaré.

Recommandations à la suite de l'avortement

À LA MAISON

- Si vous avez de jeunes enfants, il peut être aidant de prévoir une personne de soutien pour les prendre en charge au besoin;
- Mangez selon vos goûts et buvez abondamment;
- Évitez toutes activités physiques trop intenses dans la semaine qui suit l'avortement;
- Reposez-vous si vous en sentez le besoin.

PREVENTION DES INFECTIONS

Ne rien insérer dans le vagin durant une semaine (7 jours) :

- Pas de relations sexuelles avec pénétration;
- Pas de tampons hygiéniques ni de coupe menstruelle de type Diva Cup ou Keeper. Utiliser seulement des serviettes hygiéniques non parfumées;
- Pas de vibreur, jouets sexuels;
- Pas de douche vaginale ni de désodorisant vaginal;
- Pas de baignade en piscine ou en lac;
- Pas de bain-tourbillon ou spa.

Vous pouvez prendre une douche ou un bain à la maison sans ajout de produits parfumés.

Si vous avez des douleurs au bas ventre, des pertes vaginales malodorantes, un saignement vaginal qui n'arrête pas, un malaise général, une faiblesse et/ou de la fièvre, vous pourriez faire une infection de l'utérus. Contactez- nous ou rendez-vous à l'urgence la plus près de votre domicile.

SAIGNEMENTS

Les saignements peuvent varier d'une femme à l'autre et d'une interruption de grossesse à l'autre chez la même femme :

- Ils peuvent débuter après la prise de la mifépristone, mais débuteront habituellement après la prise du misoprostol;
- Ils peuvent être abondants, mais diminueront progressivement sur une période de deux semaines;
- Ils peuvent contenir des caillots, être rougeâtres ou brunâtres;
- Ils peuvent sembler plus abondants quand vous vous levez le matin, quand vous allez à la toilette, ou si vous êtes très active physiquement;
- Les femmes qui utilisent habituellement des tampons peuvent avoir l'impression de saigner davantage avec une serviette hygiénique.
- Si vous n'avez pas eu de saignements 48 heures après la prise du Misoprostol, contactez-nous.

CRAMPES ET DOULEURS ABDOMINALES

Il est normal d'avoir des crampes intenses pendant un avortement médical. Certaines femmes s'inquiètent, car elles n'en ont jamais ressenties. Elles peuvent survenir à partir de la prise de la mifépristone, mais elles surviendront probablement quelques heures après la prise du misoprostol. Elles peuvent être plus fortes que des crampes menstruelles.

Pour aider à soulager la douleur, vous pouvez :

- Utiliser des compresses chaudes/froides, une bouillotte ou un coussin chauffant;
- Masser votre ventre;
- Marcher;
- Prendre un analgésique.
 - **Pour douleurs légères à modérées** : prendre le Tylenol^{MD} et le Naproxen^{MD} tel que prescrit par le médecin. L'aspirine est déconseillée, car elle augmente les saignements;
 - **Pour douleurs sévères** : prendre un comprimé de Dilaudid^{MD}, aux quatre heures, selon le niveau de la douleur, tel que prescrit par le médecin. Ne pas prendre d'alcool ou de drogues dans les 24h après avoir pris ce médicament.

Il est recommandé de vous procurer à l'avance les médicaments prescrits pour soulager vos douleurs.

NAUSEES ET VOMISSEMENTS

Si vous présentez de la nausée ou des vomissements, vous pouvez utiliser du Graval^{MD} en comprimés ou en suppositoires rectaux. Au besoin, répéter la prise d'anti-nauséeux selon les recommandations du pharmacien. Ces symptômes sont les premiers à disparaître, généralement dans les jours qui suivent la prise des comprimés, sinon, contactez-nous.

CONTRACEPTION

Même si vous n'avez pas encore eu vos menstruations, **vous pouvez devenir enceinte dès votre prochaine relation sexuelle** en n'utilisant pas de méthode de contraception.

- Il est recommandé d'éviter une grossesse au cours du cycle menstruel suivant l'avortement vu le risque d'exposition potentiel pour le fœtus à la mifépristone et misoprostol;
- Si vous avez choisi la pilule contraceptive, le timbre (Evra), l'anneau vaginal (Nuvaring) ou un progestatif injectable (Depo provera), vous pouvez débuter votre contraception le jour même ou le lendemain de la prise du misoprostol. Ces méthodes prennent sept jours avant d'être efficaces. Pendant cette période, il est recommandé d'utiliser une méthode contraceptive complémentaire (condoms);
- Si vous avez choisi le stérilet ou l'implant contraceptif (Nexplanon), celui-ci pourra être installé à la suite de la rencontre de suivi avec l'infirmière deux semaines après l'avortement;
- S'abstenir de relations sexuelles non protégées d'ici la pose du stérilet ou de l'implant contraceptif (Nexplanon).

VOTRE SEXUALITE

Vous pouvez reprendre vos activités sexuelles avec pénétration 7 jours après l'avortement.

Il est possible qu'après une interruption de grossesse, vous observiez des changements par rapport à votre vie sexuelle, par exemple, que vous n'avez pas envie de faire l'amour pendant un certain temps. Soyez à l'écoute de votre corps et prenez le temps de retrouver votre désir.

S'il y a des aspects de votre sexualité qui ne vous plaisent pas, prenez aussi le temps d'en parler et de chercher une solution.

VOS EMOTIONS

Chaque femme peut ressentir des émotions différentes et c'est normal. Beaucoup de femmes se sentent soulagées après l'avortement, ce qui n'empêche pas qu'on puisse se sentir triste, déçue, coupable, seule, ou qu'on ait un sentiment de perte. Certaines femmes ou couples vivront une période de deuil. La tristesse est une émotion saine et elle s'apaise avec le temps. On peut aussi avoir l'impression d'être plus mature, plus responsable ou même se sentir fière d'avoir pris une décision importante. Cette expérience est l'occasion pour bien des femmes de faire un bilan de leur vie, d'apprendre à mieux se connaître et à s'affirmer. Si vous avez envie de parler de ce que vous ressentez, que ce soit maintenant ou plus tard, faites-le. C'est bon de partager avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Votre santé émotionnelle est aussi importante que votre santé physique. Vous pouvez aussi nous téléphoner et nous pourrions vous proposer une rencontre ou vous diriger vers d'autres services qui pourraient vous aider.

**En tout temps, si vous êtes inquiète,
n'hésitez pas à nous téléphoner.**

Plan d'urgence

Si vous présentez les symptômes suivants, consultez immédiatement à l'urgence la plus près de votre domicile.

SIGNES D'INFECTION

- Un pic de fièvre (plus de 38° Celsius) qui survient plus de 24 heures après la prise du Misoprostol (il est toutefois possible de faire de la fièvre durant moins de 6 heures pendant les 24 heures suivant la prise du Misoprostol, il s'agit d'un effet secondaire).

Il est important de prendre votre température si vous vous sentez fiévreuse puisqu'il est possible d'avoir une sensation de chaleur sans véritablement faire de la fièvre.

DOULEURS ABDOMINALES

- Douleurs abdominales importantes, qui persistent ou qui augmentent et non soulagées par la prise de médicaments antidouleur ou nouvelle douleur d'apparition soudaine.

SENSATION D'ÊTRE «MALADE» ET PRESENCE DE SYMPTOMES RESSEMBLANT A CEUX DE LA GRIPPE

- Faiblesse/ malaise, douleurs musculaires, toux sèche, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée. Ces symptômes peuvent apparaître dans les jours suivant l'avortement.

SAIGNEMENTS

- Saignements abondants, 2 maxi-serviettes imbibées au complet en une heure, pendant 2 heures de suite;

- Saignements plus abondants qu'une menstruation habituelle, mais avec présence de symptômes orthostatiques (faiblesse, étourdissements, pouls rapide ou évanouissement) ou de symptômes comme la lipothymie (malaise sans perte de conscience).

SIGNES DE RUPTURE GROSSESSE ECTOPIQUE

- Douleur soudaine dans le bas-ventre (souvent plus intense d'un côté), accentuation de la douleur, nausée, apparition soudaine d'une douleur à l'épaule, souffle court, étourdissement, perte de conscience.

REACTIONS ALLERGIQUES

- Éruptions cutanées, démangeaisons, difficultés respiratoires;

Si vous consultez un professionnel de la santé, vous devez apporter la feuille *Fiche de renseignements importants en cas d'urgence* pour qu'il puisse être informé que vous êtes en processus d'avortement médical au Mifegymiso.

Il est recommandé d'être à moins d'une heure d'un service d'urgence dans les premiers jours suivant la prise de la mifépristone en cas de complications médicales.

La santé des femmes, ça vaut le coût!

Un don pour signifier votre appui
est un don pour la continuité.

Reçu pour fins d'impôts sur demande

CSFM 20250225